

Hongos

Botritis

Enfermedad más común de las herbáceas ornamentales; se presenta como mancha gris que cubre hojas, flores y frutos.

▶ DAÑOS

Provoca oscurecimiento de los botones florales en Crisantemos, Camelias y Rosas, aunque puede manifestarse como pudrición de frutos, tallos y caída de hojas o putrefacción de cornos (Tulipanes y Gladiolos), raíces y semillas. También provocan damping-off o caída de plántulas. Afecta de preferencia a tejidos viejos o bien almácigos en formación.

▶ PLANTAS MÁS SUSCEPTIBLES

Camelias, Azaleas, Rosal, Magnolia, Lavandas y Petunias.

▶ CONTROL

Controles preventivos cuando se formen los botones florales; favorecer ventilación y luminosidad. Hay que tener especial cuidado durante la poda y cuando se entresaquen hojas. Se deben proteger las plantas delicadas de las lluvias persistentes y de manera preventiva, disminuya los riegos y la humedad ambiental. El suelo debe drenar bien.

Coloque las macetas en lugares bien ventilados. En invernaderos debe ventilar e impedir el exceso de humedad en el ambiente.

Cortar las partes que estén afectadas por Botritis o eliminar la planta completa para que no infecte a otras cercanas. Se recomienda no plantar una misma especie en la tierra donde ha habido una planta afectada por Botritis; el hongo puede quedar en el suelo e infectar a la nueva especie.

▶ PRODUCTOS RECOMENDADOS

CAPTAN (i.a. Captan) **Dosis:** 10 g en 1 lt de agua.

HONGOS (i.a. Mancozeb + Benomil) **Dosis:** 10 g en 1 lt de agua.