

Plagas

Tiro de munición

Enfermedad causada por un hongo que ataca especialmente a carozos (durazno, cerezo, almendro, entre otros) y que puede afectar a todas las partes del árbol; ramas, yemas, hojas, flores y frutos.

▶ DAÑOS

En las hojas es característico presenciar lesiones rojizas con un centro más oscuro que se van expandiendo y más tarde, el centro se desprende de la hoja quedando un agujero. En las ramas se ven lesiones con bordes marcados y con el centro necrótico pero no se desprenden como en las hojas, y en los frutos se observan lesiones de colores rojizos que luego se tornan necróticas. Estos síntomas pueden llegar a producir muerte de ramillas, yemas, debilitamiento general del árbol y pérdida de frutos.

▶ CONTROL

Su diseminación se da por el agua de lluvia, el viento y utensilios de poda, por lo que para su manejo se sugiere realizar riegos adecuados, evitando el riego por aspersión y aposamientos, además de la desinfección de herramientas, y una correcta poda evitando exceso de humedad y asegurando entrada de luz al árbol. Mantenga sus árboles adecuadamente fertilizados con **Fertifrutas**. Aplique **Oxicloruro de Cobre** en forma preventiva desde la caída de las hojas (otoño) hasta la yema hinchada (fin de invierno), y en primavera posterior a la floración y en dosis recomendadas. En forma curativa repita de 7 a 15 días su aplicación.

▶ PRODUCTOS RECOMENDADOS

OXICLORURO DE COBRE: Dosis: 10 g en 1 lt de agua.