

Insectos

Conchuelas

Las Conchuelas son Insectos Chupadores que se alimentan al igual que los Pulgones, de la savia de las plantas. Las hembras están cubiertas por un caparazón de color café oscuro, y sólo cuando están maduras su piel se torna dura. Son de un tamaño variable, viven en colonias y se adhieren fuertemente a los tallos y hojas (nervaduras de la parte inferior) de plantas, arbustos y árboles. Los machos adultos llevan una vida libre, poseen un par de alas y son de tamaño muy pequeño. Desde la superficie, al mirar una planta sólo es visible el manto que conforma la conchuela, el que está adherido al cuerpo de manera que al tomarlo se levanta también el cuerpo.

▶ DAÑOS

Los daños que causa su presencia en las plantas son debilitamiento y muerte de ramas y ramillas, además del deterioro de la calidad de la fruta debido a la mielecilla secretada, además es frecuente la presencia de Fumagina en forma secundaria que se desarrolla en ella.

▶ PLANTAS MÁS SUSCEPTIBLES

Naranjos, Limoneros, Laurel de flor, Aucuba, Árbol de Judea, Parra, y plantas de interior (como Shefleras y Ficus).

▶ CONTROL

Aplicar los productos recomendados a fines de invierno, principios de primavera y en verano cuando comienzan a aparecer las primeras ninfas migratorias móviles, las cuales son más vulnerables y sensibles a los insecticidas. Por ello es preciso estar atentos a la evolución de la plaga ya que los huevos bajo el escudo de la madre son muy resistentes. Importante es considerar que las Conchuelas se desarrollan con gran rapidez por lo que siempre es mejor tratar con la primera aparición de individuos.

Para el control de Conchuelas en plantas de interior se recomienda usar Aceite Springhill solo o con la dosis mínima de insecticida recomendada y sacar las plantas tratadas al exterior, a un lugar ventilado. Realizar aplicaciones cada 10 a 15 días hasta observar desaparición de la infestación. Si el control se realiza sobre frutales u hortalizas, el período de carencia de los productos es de 7 a 14 días.

▶ PRODUCTOS RECOMENDADOS

CONCHUELAS (i.a. Diazinón) **Dosis:** 10 cc. en 1 Lt. de agua.

ACEITE SPRINGHILL **Dosis:** 8 a 10 cc. en 1 Lt. de agua.