

*Insectos*

## Gusanos y Chanchitos de tierra

Son estados intermedios, poseen una vida corta de aproximadamente un mes. Se presentan con gran variabilidad en aspecto y tamaño, generalmente son larvas de colores poco vistosos.

A diferencia de las cuncunas no se encuentran en el follaje sino que en el suelo. Son más activos al atardecer o de noche. El chanchito de tierra es perjudicial sólo cuando las poblaciones son altas.

### ▶ DAÑOS

El daño que provoca es a nivel de suelo, el ataque aparece en primavera, cortando plántulas después de la emergencia o trasplante. El daño que provocan los gusanos también es a nivel de suelo, cortan y muerden estructuras vegetales, este daño es agravado cuando la humedad es alta.

### ▶ PLANTAS MÁS SUSCEPTIBLES

Prados y cubresuelos.

### ▶ CONTROL

Recomendamos eliminar las larvas y adultos que se encuentran en la tierra, aplicando un insecticida con acción directa sobre gusanos que viven en el suelo.

El control en este tipo de plaga se realiza con productos en polvo, que luego de aplicar en la tierra se incorpora mediante el riego, también se puede aplicar disolviendo previamente el producto en agua para dar una mejor y completa fumigación.

### ▶ PRODUCTOS RECOMENDADOS

**DIAZINON** (i.a. Diazinón) **Dosis:** Disolver 10 g. en 10 Lt. de agua, para 5m<sup>2</sup> de superficie.

**TERRASAN** (i.a. Diazinón + Metalaxil) **Dosis:** 10 g. por m<sup>2</sup>, mezclar con sustrato para incorporar.